Contrôle TD n° 1 : Version corrigée

Licence 1^{er} année, Math2C, groupe MI2-M

20 Février 2024

Exercice 1

Trouver la primite de les fonctions suivantes et indiquer le domaine de définition de chaque primitive:

1. $f(x) = x^3 e^{x^2}$ (Indication: utiliser le changement de variable $u(x) = x^2$ puis intégration par parties).

Solution : Soit le changement de variable $u = x^2$, ça implique que du = 2xdx (en fait du/2 = xdx), alors on obtient que

$$\int x^3 e^{x^2} dx = \frac{1}{2} \int u e^u du.$$

En faisant intégration par parties, on pose v=u et $w'=e^u$, donc v'=1 et $w=e^u$, puis

$$\int ue^u du = ue^u - \int e^u du = e^u (u - 1) + c.$$

Finalement, $\int x^3 e^{x^2} dx = \frac{e^{x^2}}{2} (x^2 - 1) + c$, où c est une constante réelle. Clairement le domaine de définition est $D = \mathbb{R}$

2. $g(x) = \frac{6x}{(x+1)(x-2)}$ (Indication: utiliser fractions partielles)

Solution: On écrit
$$\frac{6x}{(x+1)(x-2)} = \frac{a}{x+1} + \frac{b}{x-2}$$
, alors
$$\frac{a}{x+1} + \frac{b}{x-2} = \frac{a(x-2) + b(x+1)}{(x+1)(x-2)}$$
$$= \frac{x(a+b) + (-2a+b)}{(x+1)(x-2)}$$

d'où on obtient le système d'équations

$$\begin{cases} a+b=6\\ -2a+b=0 \end{cases}$$

c'est-à-dire a=2 et b=4. Donc

$$\int \frac{8}{(x-1)(x+3)} dx = 2 \int \frac{dx}{x+1} + 4 \int \frac{dx}{x-2}$$
$$= 2\ln(|x+1|) + 4\ln(|x-2|) + c$$
$$= \ln((x+1)^2(x-2)^4) + c,$$

où c est une constante réelle. Domaine de définition $D = \mathbb{R} \setminus \{-1, 2\}$.

Exercice 2

Trouver la solution générale des EDO suivantes:

1. $y' + x(\sinh(x))y = 0$.

Solution : L'équation est de variables séparées (si $y(x) \neq 0$)

$$\frac{y'}{y} = -x\sinh(x) \Longleftrightarrow \int \frac{dy}{y} = -\int x\sinh(x)dx$$

$$\ln(|y|) = -x\cosh(x) + \int \cosh(x)dx$$

$$\ln(|y|) = -x\cosh(x) + \sinh(x) + c$$

$$|y(x)| = Ke^{-x\cosh(x) + \sinh(x)}$$

où K est une constante positive. Alors la solution générale est $y(x) = Ke^{-x\cosh(x) + \sinh(x)}$ où maintenant K est un constante réelle.

Addendum: Noter que si on a le problème de Cauchy

$$\begin{cases} y' + x \sinh(x)y = 0\\ y(x_0) = y_0, \end{cases}$$

si la condition initiale y_0 est negative, alors K es negative et si $y_0 > 0$ alors K > 0. Si la condition initial est égale à 0 alors on a une solution constante nulle.

Exercice 3

Résoudre les problèmes de Cauchy suivants

(1)
$$\begin{cases} (1+x^2)y' + y = 1\\ y(0) = 2, \end{cases}$$
 (2)
$$\begin{cases} (1+x^2)y' + y = 1\\ y(0) = 1 \end{cases}$$

Solution : L'équation (2) admet une solution constante y(x) = 1. Pour l'équation (1) on separe les variables

$$\frac{y'}{1-y} = \frac{1}{1+x^2} \Longleftrightarrow \int \frac{dy}{1-y} = \int \frac{dx}{1+x^2}$$
$$-\ln(|1-y|) = \arctan(x) + c$$

Evaluant dans x=0 on obtient que c=0. Alors $|1-y|=e^{-\arctan(x)}$, comme y(0)=2 donc 1-y(0)<0, en particulière il existe un voisinage I contenant x=0 où 1-y(x)<0 pour tout $x\in I$. Dans cet cas on obtient $y(x)=e^{-\arctan(x)}+1$.

Addendum : Les solutions sont clairement continues dans $D = \mathbb{R}$. Ci dessous, vous trouverez le champ de tangentes associé à l'équation, avec la representation graphique des solution.

Figure 1: Champ de tangentes avec la solution pour y(0) = 1.




Figure 2: Champ de tangentes avec la solution pour y(0) = 2.

